ตามัว (Visual loss)

1. สายตาผิดปกติ (Refractive errors)
   - 1.1 Myopia
   - 1.2 Hyperopia
   - 1.3 Astigmatism
   - 1.4 Presbyopia

2. มัชฌิมของตาผิดปกติ (Ocular media in origin) มีโรคมากมายที่อาจจะเกิด จากสาเหตุในกลุ่มนี้ ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่พบบ่อยๆ
   - 2.1 มัวทันทีหรือค่อนข้างเร็ว เช่น:-
     - Acute angle closure glaucoma
     - Corneal ulcer
     - Acute anterior and posterior uveitis
     - Acute hydrops
     - Ocular trauma เช่น
       - Hyphema
       - Vitreous hemorrhage
       - Corneal rupture, laceration
       - Traumatic cataract
       - Ocular infection (endophthalmitis)
     - Vitreous hemorrhage จากสาเหตุ เช่น
       - PDR
       - ARMD
       - Retinal vasculitis
     - Endophthalmitis จากสาเหตุอื่น เช่น
       - หลังผ่าตัด
       - Endogenous
   - 2.2 ค่อยๆ มัว เช่น
     - Cataract
     - Chronic anterior and posterior uveitis
     - Corneal decompensation
     - Dry eye

3. ส่วนรับภาพผิดปกติ (Sensory system in origin) ตัวอย่างเช่น:-
   - 3.1 มัวทันทีหรือค่อนข้างเร็ว เช่น
     - Retinal detachment รวมทั้ง rhegma-togenous, serous และ tractional
     - Central or branch retinal artery occlusion
     - Central or branch retinal vein occlusion
     - Retinitis from various causes
     - Papillitis or retrobulbar optic neuritis
     - ARMD
   - 3.2 ค่อยๆ มัว เช่น
     - Diabetic retinopathy
     - Primary open angle glaucoma
     - ARMD
   - 3.3 มัวชั่วคราว (Transient) เช่น
     - **มัวข้างเดียว**
     - Amaurosis fugax
     - Retinal migraine
     - Dry eye
     - Papilledema
     - **มัวสองข้าง**
     - Migraine
     - Transient ischemic attack
     - Papilledema

4. แกล้งมัว (Malingering) อาจพบได้ในบางรายเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ต้องอาศัยการตรวจหลายอย่างประกอบกัน หรือถ้าจำเป็นต้องให้จักษุแพทย์ตรวจ 2-3 คน