

แฮมสเตอร์ (HAMSTER)



เรียกกันทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยว่า แฮมสเตอร์

รูปร่างลักษณะ คล้ายหนูตะเภา แต่รูปร่างเล็กกว่ามาก ปราดเปรี้ยว คุ ไม่คุ้นกับคนง่ายเหมือนหนูแรท
ตีนดำตาลทอง เลี้ยงขยายพันธุ์ยาก มีนิสัยขู เวลาคลอคลุก ถ้าผู้เลี้ยงไปเคลื่อนไหวย้าย หรือจับต้องตัวลูกจะกินลูก

หมด

น้ำหนักเพศผู้โตเต็มที่	(Wt., adult male)	85-110 กรัม
น้ำหนักเพศเมียโตเต็มที่	(Wt., adult female)	95-120 กรัม
น้ำหนักแรกเกิด	(Birth Wt.)	2 กรัม
อายุเริ่มผสมพันธุ์เพศเมีย	(Female breeding age)	8-10 สัปดาห์
อายุเริ่มผสมพันธุ์เพศผู้	(Male breeding age)	8-10 สัปดาห์
วงจรการเป็นสัด	(Oestrus cycle)	4 วัน
ระยะตั้งท้อง	(Gestation range)	15-18 วัน
อายุหย่านม	(Weaning age)	21 วัน
จำนวนลูกต่อครอก	(Litter size)	4-12 ตัว
การผสมพันธุ์ครั้งต่อไป	(Rebreed after partrition)	4 วัน
อายุการให้ลูกของตัวเมีย	(Breeding life of female)	1 ปี
อายุการเป็นพ่อพันธุ์	(Breeding life of male)	1 ปี

การผสม ใช้วิธีผสมรวม (colony) ตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 3-5 ตัว และแบบคู่ (pair) ตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 1 ตัว

ความต้องการน้ำดื่ม	(Water requirements)	ให้เต็มที่
ความต้องการอาหาร	(Feed usage)	8-15 กรัม ต่อวันต่อตัว
ลูกแฮมสเตอร์เริ่มกินอาหารได้เมื่ออายุ	(Young begin dry food Consumption)	7-9 วัน
อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมในการเลี้ยง	(Recommended temperature)	65-75 องศาฟาเรนไฮด์
ความชื้น	(Humidity)	55-60 %
แสงสว่าง	(Light requirement)	14 ชั่วโมง
อัตราการเต้นของหัวใจ	(Heart beats/minute)	450(300-600) ครั้ง-นาที
อัตราการหายใจ	(Breathing rate / minute)	74(33-127) ครั้ง-นาที
อุณหภูมิของร่างกาย	(Body temperature)	96.8องศาฟาเรนไฮด์ (36.0องศาเซนเซียต)

