

**หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการบำบัดรักษา - ผ่าตัด**  
**การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนเจจูนัม (Laparoscopic Feeding jejunostomy)**  
**โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... เวลา .....

ผู้ป่วยชื่อ.....นามสกุล.....

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยควรรับทราบเพื่อให้ความยินยอมในการเข้ารับการรักษายาบาล

วิธีการรักษา คือ การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องเข้าสู่ลำไส้เล็กโดย ผ่าตัดส่องกล้องเข้าสู่ช่องท้องเพื่อทำหัตถการ

เหตุผลที่แพทย์ต้องใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง

- เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารทางปากเองได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่รู้สึกตัวจาก การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง กินทางปากแล้วสำลัก ไม่สามารถกลืนเองได้
- ภาวะทางเดินอาหารส่วนต้นอุดตันจาก เนื้องอกบริเวณหลอดอาหาร หรือ กระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เล็กส่วน duodenum หรือ ตับอ่อน มากดเบียด
- ภาวะเนื้องอกในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้การไหลเวียนและการดูดซึมสารอาหาร ผิดปกติ ร่างกายไม่สามารถได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก โดยการดมยาสลบซึ่งจะได้รับการดูแลจากวิสัญญีแพทย์

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น

- มีโดยการผ่าตัดใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องแบบเปิดโดยทำการเปิดแผลในแนวทแยงหน้าท้อง ขนาดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร เพื่อ ใส่สายผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในลำไส้เล็กโดยตรง แต่เป็นวิธีผ่าตัดแบบมาตรฐานทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กว่า เจ็บแผลมากกว่า ใช้เวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดนานกว่า มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนกับบาดแผลผ่าตัดตามมาได้

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้คือ

- แผลผ่าตัดขนาดเล็กกว่า ที่สายให้อาหารผ่านออกมาทางหน้าท้อง ความสวยงามของ แผลที่จะมีขนาดเล็ก , เจ็บตัวน้อย, ระยะเวลาพักฟื้นตัวในโรงพยาบาลสั้น โดยเฉลี่ย 3-5 วันหลังผ่าตัด หากไม่มี ภาวะแทรกซ้อนหรือการบาดเจ็บอื่น ที่ต้อง ได้รับการรักษาต่อ

ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้คือ

- มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างผ่าตัดและการใช้ยาระงับความรู้สึก





ผลการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

- ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางรูจมูกเป็นเวลานาน
- หลีกเลี่ยงการอุดตันของทางเดินอาหารบริเวณหลอดอาหาร และทางเดินอาหาร ส่วนต้น
- ให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยได้ในรูปแบบที่เหมาะสม

ระยะเวลาในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้คือ

- หากไม่มี ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด หรือการบาดเจ็บอื่นจากการผ่าตัด ที่ต้องได้รับการรักษาต่อ ผู้ป่วย นอนโรงพยาบาลหลังจากใส่สายให้อาหารสู่ลำไส้เล็กทางหน้าท้องโดยการผ่าตัดส่องกล้อง 3-5 วัน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ

- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้แก่ บาดแผลบริเวณตำแหน่งสายให้อาหารทางหน้าท้องติดเชื้อ เลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดบาดแผลกดทับบริเวณตำแหน่ง ใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง หรือ ทำให้เกิด อันตรายต่อลำไส้ นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงจากการดมยาสลบ

1. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการบำบัดรักษา

2. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาด้วยการผ่าตัด

3. กรณีที่แพทย์จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วและไม่พบ หลักฐานการติดเชื้อข้าพเจ้า

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม รับผิดชอบดังกล่าว

โดยแพทย์ ได้อธิบายรายละเอียด เหตุผล วิธีการรักษา ความจำเป็น ของการรักษา ข้าพเจ้าได้รับทราบและ เข้าใจ ข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ให้ความยินยอมซึ่งเป็น ☐ ผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น .....ของผู้ป่วย

ลายพิมพ์นิ้วมือข้าง..... นิ้ว .....

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายผู้ป่วย ☐ ไม่มีพยานฝ่ายผู้ป่วย(ผู้ป่วยมาคนเดียว)

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น .....ของผู้ป่วย

ลงชื่อ ..... ผู้ให้คำอธิบาย ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)

ลงชื่อ ..... พยานฝ่ายผู้ให้การรักษา ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)



