



หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการบำบัดรักษา - ผ่าตัด
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร(การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ป่วยชื่อ นามสกุล.....

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยหรือผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยควรรับทราบในการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

- ข้อมูล รายละเอียด เหตุผล ความจำเป็น ในการเข้ารับการรักษา ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

เหตุผลที่แพทย์ต้องผ่าตัดเอาไส้ติ่งของผู้ป่วยออก เพราะภาวะไส้ติ่งอักเสบ ทำให้เกิดอาการปวดท้องเฉียบพลัน แรกเริ่มอาจมีอาการปวดกลางท้องไม่ทราบตำแหน่งชัดเจน ต่อมาอาการปวดจะชัดเจนบริเวณท้องด้านขวาล่าง ซึ่งอาจมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียถ่ายเหลวตามมา หากไม่ทำการผ่าตัดเร่งด่วนจะทำให้ไส้ติ่งแตก ติดเชื้อในกระแสเลือด และเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

- วิธีการรักษา ข้อห้ามการ การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านทางหน้าท้อง


- วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก .. ตมยาสลบทั่วไป

- ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น

- 1.การให้ยาฆ่าเชื้อทางกระแสเลือดและการสังเกตอาการทางหน้าท้อง แต่หากอาการทางหน้าท้องไม่ดีขึ้น จำเป็นต้องทำการผ่าตัดทางหน้าท้อง (ในกรณีให้การวินิจฉัยเป็น ไพร่งผืนทอง ที่ยังไม่เหมาะสมกับการผ่าตัด)
- 2.การผ่าตัดไส้ติ่งโดยวิธีการส่องกล้อง แต่วิธีการนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แลหากการผ่าตัดโดยวิธีนี้ไม่สำเร็จ จำเป็นต้องเปลี่ยนกลับไปใช้วิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง

- ข้อดี เมื่อใช้วิธีนี้ ... เป็นการแก้ไขที่ตรงจุด ระยะเวลาในการผ่าตัดน้อย ซึ่งไม่ต้องเสี่ยงในการดมยาสลบเป็นเวลานาน

- ข้อเสีย เมื่อใช้วิธีนี้ ...มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องด้านขวาล่าง หากพบว่าเป็นไส้ติ่งแตกและมีการติดเชื้อในช่องท้องปริมาณมาก ต้องเปิดแผลผ่าตัดเพิ่มบริเวณกลางหน้าท้องเพื่อทำการล้างท้อง และใช้ระยะเวลาในการนอน





โรงพยาบาลน่านขึ้น กรณี พบว่ามีช่องเชิงกรานอักเสบจากเหตุผลอื่นที่ทำให้อาการคล้ายไส้ติ่งอักเสบ พบได้ 1- 5% หรือเป็นมะเร็งของไส้ติ่ง ซึ่งต้องรอผลตรวจพยาธิวิทยา อาจจะจำเป็นต้องมีการรักษาอื่นเพิ่มเติมภายหลัง

- ผลการรักษา เมื่อใช้วิธีนี้ ... ทำให้อาการปวดท้องและอาการร่วมอื่นๆที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบหายๆไป
- ระยะเวลาในการรักษา เมื่อใช้วิธีนี้ ... ผู้ป่วยจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วัน หากไม่มีอาการแทรก

ซ้อนและส่วนใหญ่สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ภายใน 3-5 วันหลังผ่าตัด


- ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีนี้ .. การผ่าไส้ติ่งอักเสบ เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยและค่อนข้างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดทุกชนิดจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง ได้แก่ เลือดออกในช่องท้อง , การติดเชื้อในช่องท้องหรือที่แผลผ่าตัด , การฉีกขาดของลำไส้ใหญ่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้มีความเสี่ยงที่เกิดจากการดมยาสลบ และเมื่อผ่าตัดแล้วมีโอกาสพบว่าไส้ติ่งปกติโดยเฉลี่ยประมาณ 15% (เพศชาย 9.3% เพศหญิง 22.2%) ซึ่งพบว่าเป็นโรคชนิดอื่นๆ เช่น ลำไส้ใหญ่ข้างขวอักเสบ มะเร็งลำไส้ใหญ่ และเนื้องอกของตัวไส้ติ่งเอง เป็นต้น

1. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทำการบำบัดรักษา
- 2.ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอมให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่รักษาด้วยการผ่าตัด
3. กรณีที่แพทย์จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วและไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ

ข้าพเจ้า

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม รับเลือดดังกล่าว

โดยแพทย์ ได้อธิบายรายละเอียด เหตุผล วิธีการรักษา ความจำเป็น ของการรักษา
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ





J-121-0011 ใบยินยอม

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอมซึ่งเป็น

☐ ผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (.....)

☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลายพิมพ์นิ้วมือข้าง..... นิ้ว

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ป่วย

☐ ไม่มีพยานฝ่ายผู้ป่วย ผู้ป่วยมาคนเดียว

ชื่อ-สกุล (.....)

☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลงชื่อ ผู้ให้คำอธิบาย


☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ให้การรักษา

ชื่อ-สกุล (.....)

☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....



I-121-0011 ใบยินยอม