



ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยเพื่อรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการบำบัดรักษา- ผ่าตัด
ศัลยกรรมระบบทรวงอก Empyema thoracis (หนองในเยื่อหุ้มปอด)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ป่วยชื่อ.....นามสกุล.....

ชื่อการผ่าตัด (procedure)

ข้อมูลที่ผู้ป่วยหรือผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยควรรับทราบเพื่อให้ความยินยอมในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล

ข้อมูล รายละเอียด เหตุผล ความจำเป็น ในการเข้ารับการรักษา

โรคหนองในเยื่อหุ้มปอดเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดตามหลังการติดเชื้อปอด
อักเสบแล้วได้รับการรักษาไม่เพียงพอหรือภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายผู้ป่วยไม่แข็งแรง ทำให้ผู้ป่วยมีไข้ ไอ
อ่อนเพลีย หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร เป็นต้น ซึ่งการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค หากเป็นระยะ
เริ่มแรกวิธีการรักษาคือการใส่ท่อระบายหนองออก หากสามารถระบายหนองออกได้หมดและอาการผู้ป่วย
ดีขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัด เพียงแต่ต้องให้ยาปฏิชีวนะนานอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ แต่ถ้าอาการไม่
ดีขึ้นหรือจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกพบว่ายังมีหนองอยู่ ซึ่งแสดงว่าเป็นระยะที่ 2 หรือ 3 แล้ว ก็มีความ
จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การตัดซี่โครงออก 1 -3 ซี่ เพื่อทำการระบายหนองออกให้หมด หรือ
การลอกเยื่ออักเสบติดเชื้อออกจากเยื่อหุ้มปอด อาจใช้การเปิดแผลที่ทรวงอกขนาดใหญ่หรือการใช้กล้อง
ช่วยในการผ่าตัด ทั้งนี้หากไม่ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดจะทำให้การดำเนินโรคเป็นมากขึ้น อาจเกิดการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังอาจทำให้ปอดไม่

ข้อห้ามการ

- การผ่าตัดระบายหนองและลอกเยื่อหุ้มที่คลุมปอดออก

วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก

- ดมยาสลบทั่วไป

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น

- การใส่สายท่อระบายหนองซึ่งอาจไม่ทำให้หายจากโรคได้

ข้อดี เมื่อใช้วิธีนี้

- สามารถระบายหนองออกได้หมด และทำให้ปอดขยายตัวเต็มที่

ข้อเสีย เมื่อใช้วิธีนี้

- อาจมีการสูญเสียเลือดได้บ้าง และบางครั้งอาจกลับเป็นซ้ำได้กรณีที่มีโพรงหนองหลงเหลืออยู่

ผลการรักษา เมื่อใช้วิธีนี้

- ผู้ป่วยหายจากโรค





J-121-0011 ใบยินยอม

ระยะเวลาในการรักษา เมื่อใช้วิธีนี้

- หลังผ่าตัดจะรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 5-14 วันขึ้นอยู่กับระยะของโรค

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีนี้

- เนื่องจากการผ่าตัดเปิดทรวงอกถือเป็นการผ่าตัดใหญ่จึงอาจมีภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดหรือช่วงดมยาสลบได้เช่นการเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ภาวะเลือดออกมากจนไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมีไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โรคประจำตัวของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามอาจเกิดภาวะดังกล่าวได้แม้ว่าทีมแพทย์และพยาบาลจะดูแลอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม

1. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวียงใหม่ทำการบำบัดรักษา
2. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เวียงใหม่รักษาด้วยการผ่าตัด
3. กรณีที่แพทย์จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วและไม่พบหลักฐานการติดเชื้อข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม รับเลือดดังกล่าว

โดยแพทย์ ได้อธิบายรายละเอียด เหตุผล วิธีการรักษา ความจำเป็น ของการรักษา ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอมซึ่งเป็น ☐ ผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลายพิมพ์นิ้วมือข้าง..... นิ้ว

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ป่วย ☐ ไม่มีพยานฝ่ายผู้ป่วย ผู้ป่วยมาคนเดียว

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลงชื่อ ผู้ให้คำอธิบาย ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ให้การรักษา

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....



I-121-0011 ใบยินยอม