

หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการบำบัดรักษา – ผ่าตัด
การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร

(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ป่วยชื่อ.....นามสกุล.....

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ป่วย,ญาติผู้ป่วยหรือผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยควรรับทราบเพื่อให้ความยินยอมในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล

วิธีการรักษา คือ การใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร

เหตุผลที่แพทย์ต้องใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องโดยใช้กล้องส่องกระเพาะอาหาร

- เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถทานอาหารทางปากเองได้ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ไม้รู้สึกตัวจากการบาดเจ็บที่
ศีรษะอย่างรุนแรง หรือ กินทางปากแล้วสำลัก ทำให้ต้องใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางรูจมูก
(nasogastric tube) ซึ่งถ้าใส่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการกดทับของสายกับเยื่อในรูจมูก(pressure
necrosis) นอกจากนี้หลอดทางเดินอาหารส่วนล่างที่ปิดไม่สนิท จะทำให้อาหารย้อนกลับขึ้นมาตาม หลอด
อาหารและสำลักเข้าไปในหลอดลมจนเกิดการติดเชื้อในปอดตามมาได้ ซึ่งการใส่สายให้อาหารทาง หน้า
ท้องจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้

วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก โดยการดมยาสลบ ซึ่งจะได้รับการดูแลจากวิสัญญีแพทย์

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น


- มี โดยการผ่าตัดใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องแบบเปิด ซึ่งต้องทำการเปิดแผล ในแนวกึ่งกลางหน้าท้อง
ขนาดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร เพื่อใส่สายผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในกระเพาะอาหารโดยตรง แต่เป็นวิธี
ที่ทำให้มีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กว่า เจ็บมากกว่า และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนกับบาดแผลผ่าตัดตามมาได้

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

- มีเฉพาะแผลในตำแหน่งที่สายให้อาหารผ่านออกมาทางหน้าท้อง, ความสวยงามของ แผลที่จะมีขนาดเล็ก ,
เจ็บตัวน้อย , อยู่โรงพยาบาลสั้น โดยเฉลี่ย 2-3 วันหลังผ่าตัด หากไม่มีภาวะหรือ การบาดเจ็บอื่นที่ต้อง
ได้รับการรักษาต่อ



J-121-0011 ใบยินยอม



I-121-0011 ใบยินยอม



ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

- มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างผ่าตัดและการใช้ยาระงับความรู้สึก

ผลการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

- ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการใส่สายเข้าไปในกระเพาะอาหาร ผ่านทางรูจมูก

ระยะเวลาในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้ คือ


- หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด หรือไม่มีภาวะหรือ การบาดเจ็บอื่นที่ต้องได้รับการรักษาต่อ ผู้ป่วยจะนอนโรงพยาบาลหลังจากใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง โดยใช้กล่องส่งกระเพาะอาหารอย่างน้อย 2-3 วัน

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ

- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ ได้แก่ บาดแผลใน ตำแหน่งที่ใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องติดเชื้อ, เลือดออกในกระเพาะอาหาร, เกิดบาดแผลกดทับใน ตำแหน่งที่ใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง หรือทำให้เกิดอันตรายต่อลำไส้. นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงที่ เกิดจากการดมยาสลบ

1. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำการบำบัดรักษา
2. ข้าพเจ้า ☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาด้วยการผ่าตัด
3. กรณีที่แพทย์จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วและไม่พบ หลักฐานการติดเชื้อข้าพเจ้า
☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม รับเลือดดังกล่าว

โดยแพทย์ ได้อธิบายรายละเอียด เหตุผล วิธีการรักษา ความจำเป็น ของการรักษา ข้าพเจ้าได้รับทราบและ เข้าใจ ข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ





J-121-0011 ใบยินยอม

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอมซึ่งเป็น ☐ ผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลายพิมพ์นิ้วมือข้าง..... นิ้ว

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ป่วย ☐ ไม่มีพยานฝ่ายผู้ป่วย(ผู้ป่วยมาคนเดียว)


ชื่อ-สกุล (.....) ☐ เกี่ยวข้องเป็น ของผู้ป่วย

ลงชื่อ ผู้ให้คำอธิบาย ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ให้การรักษา ☐ ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)



I-121-0011 ใบยินยอม