

หนังสือรับทราบและยินยอมให้แพทย์ทำการบำบัดรักษา-ผ่าตัด

การผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอ

Tracheostomy tube

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ผู้ป่วยชื่อ.....นามสกุล.....

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของผู้ป่วย, ญาติผู้ป่วยหรือผู้ให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยควรรับทราบเพื่อให้ความยินยอมใน การเข้ารับการรักษาพยาบาล

วิธีการรักษา คือ การผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอ

เหตุผลที่แพทย์ต้องใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอมีหลายสาเหตุ ได้แก่

- มีภาวะอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบน (upper airway obstruction) จากสาเหตุต่างๆ
- ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน (prolong intubation) เนื่องจากมีการบาดเจ็บของศีรษะอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา หรือ ไม่มีแรงในการขับเสมหะได้ด้วยตนเองต้องช่วยดูดเสมหะผ่านท่อช่วยหายใจ มีหลักฐานทางการแพทย์ที่สนับสนุนว่าการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานานเกิน 2 สัปดาห์ จะสัมพันธ์กับการติดเชื้อในปอดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
- มีการบาดเจ็บของกระดูกบริเวณใบหน้าอย่างรุนแรงร่วมกับมีกระดูกฐานกะโหลกแตกร่วมด้วย ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดยึดกระดูกใบหน้า และไม่สามารถใส่ท่อช่วยหายใจผ่านทางรูจมูกได้ในขณะที่ใช้ยาระงับความรู้สึก จึงจำเป็นต้องผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอในระหว่างผ่าตัด.

การรักษา คือ การผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอ

วิธีการใช้ยาระงับความรู้สึก คือ การดมยาสลบ ซึ่งจะได้รับการดูแลจากวิสัญญีแพทย์

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ไม่มีทางเลือกอื่นในการรักษา

ข้อดีเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

- ช่วยเปิดทางเดินหายใจในกรณีที่มีภาวะอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบน



J-121-0011 ใบยินยอม



J-121-0011 ใบยินยอม


- ทำให้การช่วยดูดเสมหะทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุของการติดเชื้อในปอดได้ และอาจทำให้หยุดเครื่องช่วยหายใจได้เร็วขึ้นในกรณีที่เกิดจากไม่มีแรงในการขับเสมหะ
- ในกรณีที่การบาดเจ็บของกระดูกใบหน้าอย่างรุนแรง ร่วมกับมีกระดูกฐานกะโหลกแตกร่วมด้วย การใส่ท่อหลอดลมบริเวณคอจะช่วยลดความเสี่ยงที่ท่อช่วยหายใจจะใส่ผ่านรูจมูกทะลุกระดูกฐานกะโหลกแตกผ่านเข้าไปในสมองได้.

ข้อเสียเมื่อใช้วิธีนี้ คือ

ระยะเวลาในการรักษาเมื่อใช้วิธีนี้ สายระบายในช่องเยื่อหุ้มปอดจะใส่ไว้จนกว่าลมหรือเลือดจะระบายออกหมด จึงไม่สามารถบอกระยะเวลาที่ชัดเจนได้

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

- เลือดออก อาจมีเลือดออกจากเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังโดยรอบ, หลอดเลือดบริเวณคอและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงต่อมไทรอยด์.
- ลมรั่วใต้ผิวหนัง หรือเยื่อหุ้มปอด เนื่องจากลมรั่วที่ออกมาจากขอบของทางเปิดหลอดลมคอเขาไปตามเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังหากมีปริมาณมาก อาจเขาไปถึงเยื่อหุ้มปอดได้.
- ท่อหลอดลมคออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม พบได้น้อย มักจะตรวจพบในขณะที่ทำการผ่าตัดหรืออาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ท่อหลอดลมคอหลุดแล้วใส่ไม่ถูกวิธี.
- บาดแผลผ่าตัดติดเชื้อ



I-121-0011 ใบยินยอม



J-121-0011 ใบยินยอม

1. ข้าพเจ้า ยินยอม ไม่ยินยอม

ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการบำบัดรักษา

2. ข้าพเจ้า ยินยอม ไม่ยินยอม

ให้แพทย์และทีมผู้รักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการผ่าตัด

3. กรณีที่แพทย์จำเป็นต้องให้เลือดเพื่อช่วยชีวิต ซึ่งเลือดดังกล่าวได้ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว และไม่พบหลักฐานการติดเชื้อ ข้าพเจ้า

ยินยอม ไม่ยินยอม รับเลือดดังกล่าว

4. เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องมีการตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสเอดส์ และตับอักเสบก่อนผ่าตัด ข้าพเจ้า

ยินยอม ไม่ยินยอมตรวจเลือดดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ ต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอมซึ่งเป็น ผู้ป่วย

ชื่อ-สกุล (.....) เกี่ยวข้องเป็นของผู้ป่วย

ลายพิมพ์นิ้วมือข้าง..... นิ้ว

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ป่วย ไม่มีพยานฝ่ายผู้ป่วย ผู้ป่วยมาคนเดียว

ชื่อ-สกุล (.....) เกี่ยวข้องเป็นของผู้ป่วย

ลงชื่อ ผู้ให้คำอธิบาย ตำแหน่ง หน้าที่.....

ชื่อ-สกุล (.....)

ลงชื่อ พยานฝ่ายผู้ให้การรักษา

ชื่อ-สกุล (.....) ตำแหน่ง หน้าที่.....



I-121-0011 ใบยินยอม